



MIKROVIT BOR

CONCIME FOGLIARE A BASE DI BORO ETANOLAMMINA
IN FORMULAZIONE LIQUIDA.



DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Dosi (L/ha)	N° trattamenti
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	1-1,5	3 trattamenti da BBCH 14 a BBCH 35. Se si manifestano forti sintomi di carenza, si raccomandano 3-4 trattamenti ogni 7 giorni.
PATATA	1-1,5	3 trattamenti da BBCH 21 a BBCH 47.
POMACEE E DRUPACEE	1-1,5	In primavera 3 trattamenti a BBCH 56, 60 e 67. In autunno due somministrazioni partendo dalla settimana prima della raccolta.
AGRUMI	1-1,5	2 trattamenti prima della fioritura.
PICCOLI FRUTTI	1-1,5	3 trattamenti prima della fioritura o dopo la raccolta su lampone (BBCH 91).
VITE	0,5-1,5	2 trattamenti a inizio fioritura distanziati di 7 giorni.
FRAGOLA	0,5-1,5	2 trattamenti prima della fioritura e 1 a caduta petali.
POMODORO	0,5-1,5	4 trattamenti da BBCH 18 a BBCH 56.
OLIVO	0,5-1,5	1 trattamento prima della fioritura e 1 dopo la fioritura.
ORTAGGI (BRASSICACEE)	0,5-1,5	2 trattamenti: a BBCH 13-15; BBCH 41 (cavolfiore) o BBCH 29 (cavolo broccolo).
ORTAGGI A RADICE	0,5-1,5	3 trattamenti da BBCH 15 a BBCH 47 (carota).

COMPOSIZIONE

BORO (B)
solubile in acqua 11% (150 g/l)

FORMULAZIONE

Liquido

CONFEZIONE



COLORAZIONE

Non colorato

CLASSIFICAZIONE

MISCIBILITÀ

Il formulato può essere miscelato insieme ad altri concimi o agrofarmaci (previo svolgimento di un test di compatibilità e sospensibilità).

REGISTRAZIONE

Concime CE